

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto



Fabricante


Cía. Cibeles S.A.
12 de Diciembre 767 – Tel: 2209 1001
E-mail: agro@cibeles.com.uy
Montevideo - Uruguay

Características del producto

FACILY 1,8 es un acaricida-insecticida de largo efecto residual, efectivo contra ácaros, minadores y trips. Posee bajo impacto sobre enemigos naturales y escaso efecto sobre el ambiente. FACILY 18 tiene acción translaminar pudiendo afectar insectos y ácaros que estén en el lado inferior de la hoja. Su exclusivo sitio de acción a nivel del sistema GABA hace que actúe en forma diferente a otros productos fosforados o carbamatos. Inhibe la transmisión de impulsos nerviosos provocando parálisis y muerte del insecto lo cual hace prácticamente improbable la resistencia cruzada con otros insecticidas.

Composición

Abamectina: mezcla de avermectina contenido >80% de avermectina B1a: 5-9-demetil avermectina A1a y <20% de avermectina B1b: 5-0-demetil-25-de (1-metilpropil)-25-(1-metiletil) avermectina A1a

Concentración y formulación

18 g/L, concentrado emulsionable

Nº de Registro

34.281

Modo de acción

Actúa sobre la transmisión de impulsos nerviosos. Clase II. Moderadamente peligroso.

Recomendaciones

Cultivo	Enfermedades	Dosis	TC	Momento de aplicación
Algodón	Arañuela roja común (<i>Tetranychus urticae</i>) Oruga de la hoja (<i>Alabama argillacia</i>)	300-600 cm ³ /ha	20	Iniciar pulverizaciones al notar la presencia de las primeras arañuelas o a los primeros síntomas del ataque de ácaros. Repetir cuando ocurran reinfestaciones. Aplicar cuando se determine la presencia de 50 o más orugas en 100 golpes de red de arrastre.
Apio Melon Pepino Sandía	Arañuela roja común (<i>Tetranychus urticae</i>) Gusanos minadores (<i>Liriomyza spp</i>)	80 cm ³ /hl	3	Para el control de arañuelas: pulverizar al primer indicio de infestación, con alto volumen de agua y alta presión logrando una buena cobertura de todo el follaje. Evitar escurrimiento. Para el control de minadores: Aplicar al determinarlas picaduras en las hojas o las primeras galerías. Repetir a los 7 días. Pulverizar con alto volumen de agua y alta presión. Mínimo 600cm ³ de Abamectina por ha. No realizar más de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.
Citrus	Arañuela roja (<i>Tetranychus urticae</i>),	15-20 cm ³ hl + 0,25 % aceite mineral de verano	7	Quando se observen los primeros ácaros
	Ácaro de la yema (<i>Aceria sheldoni</i>),	20 cm ³ /hl + 0,25 – 0,5 % aceite mineral de verano		Pulverizar al hincharse las yemas. No aplicar durante floración
	Ácaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	15-20 cm ³ /hl + 0,25 % aceite mineral de verano		Aplicar después de la floración, cuando observe los primeros ácaros sobre frutos formados (menor de 2 cm de diámetro). Repetir cuando ocurran nuevas infestaciones.
	Minador (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	100 cm ³ /hl + 0,5 % aceite mineral de verano	Aplicar al observar las larvas de primer estadio sobre rotes ternos morados recién formados (3-5 cm de longitud). Equipo de aplicación: Aplicaciones terrestres: volumen de aplicación 500l/ha + 1,25 l de aceite mineral. Aplicación aérea: Volumen de aplicación 20l/ha + 5 l de aceite mineral. Se recomienda mojar perfectamente toda la planta, pero evitar escurrimiento excesivo. Mezclar abamectina con el aceite y luego agregarlo al agua limpia. Mantener la mezcla en agitación constante. No aplicar más de 3 l de abamectina/ha y por época de cultivo.	
Clavel	Arañuela roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	25-50 cm ³ /hl		Con los primeros indicios de infestación con equipos de alta presión y alto volumen de agua. Dosis mínima: 560 cm ³ /hl. Dosis máxima: 1500 cm ³ /hl
Crisantemo	Arañuela roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Gusanos minadores (<i>Liriomyza spp</i>)	25-50 cm ³ /hl		Con los primeros indicios de infestación con equipos de alta presión y alto volumen de agua. Para gusanos minadores pulverizar para proteger los brotes nuevos. De ser necesario repetir cada 7 días. Dosis mínima: 560 cm ³ /hl. Dosis máxima: 1500 cm ³ /hl
Frutilla	Arañuela roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	80-100 cm ³ /hl	3	Aplicar a los primeros indicios de infestación con equipos de alta presión y alto volumen de agua. Asegurarse de mojar toda la planta, pero evitar el escurrimiento. Repetir la acción a los 7-10 días. Aplicar un mínimo de 600 ml/ha y un máximo de 1200 ml/ha. No tratar más de 4 veces por ciclo de cultivo.
Ornamentales	Arañuela roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	25-50 cm ³ /hl		Con los primeros indicios de infestación con equipos de alta presión y alto volumen de agua. Dosis mínima: 560 cm ³ /hl. Dosis máxima: 1500 cm ³ /hl

Cultivo	Enfermedades	Dosis	TC	Momento de aplicación
Peral	Arañuela roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Arañuela parda (<i>Bryobia rubrioculus</i>)	40-50 cm ³ /hl + 0,25% aceite mineral de verano	14	Para el control de ácaros: iniciar las aplicaciones al determinar 1 o 2 arañuelas por hoja. Repetir las aplicaciones de ser necesario. Mezclar con aceite mineral de verano y luego agregarlo al agua limpia.
	Psilido del peral (<i>Psylla pyricola</i>)	75 cm ³ /hl + 0,25% aceite mineral de verano		Iniciar las aplicaciones al determinar, en promedio, 1 o 2 ninfas por brote terminal o cuando aparezca la melaza típica, después de la floración. No aplicar más de 3 L de producto/ha y por época de cultivo.
Pimiento	Arañuela roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	50-70 cm ³ /hl	3	Aplicar al observar los primeros indicios de presencia de arañuela, con un alto volumen de agua y alta presión. Pulverizar todo el follaje, evitar el escurrimiento. Repetir de ser necesario. No realizar más de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.
Rosales	Arañuela roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	25-50 cm ³ /hl		Con los primeros indicios de infestación con equipos de alta presión y alto volumen de agua. Dosis mínima: 560 cm ³ /hl. Dosis máxima: 1500 cm ³ /hl
Tomate	Ácaro del bronceado (<i>Aculops lycopersici</i>)	60-70 cm ³ /hl	2	Aplicar al observar los primeros indicios de presencia de arañuela, con un alto volumen de agua y alta presión. Pulverizar todo el follaje, evitar el escurrimiento. Repetir de ser necesario. De acuerdo al volumen de agua utilizado, aplicar un mínimo de 500 cm ³ y un máximo de 1200 cm ³ de producto por ha. Usar la dosis más alta para altas infestaciones, o cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la plaga y/o cuando el cultivo muestre mayor densidad foliar.
	Arañuela roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	50-70 cm ³ /hl		
	Polilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>)	80-100 cm ³ /hl + 0,25% aceite mineral de verano		
Manzana	Arañuela roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Arañuela roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>)	40 ml/hl + 0,5 aceite mineral de verano	14	Para lograr mejores resultados, realizar la aplicación desde caída de pétalos hasta 4 semanas después.
Papa	Mosca minadora (<i>Liriomyza sp.</i>)	500-750 cm ³ /hl	30	Aplicar en presencia de las primeras galerías en la parte inferior de la planta. Usar las dosis más altas en casos de haber daño manifiesto

Compatibilidad y fitotoxicidad

Es compatible con otros terapéuticos que no contengan metales pesados. Se recomienda hacer una prueba previa.

Aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas, FACILY 1,8 no ha presentado síntomas de fitotoxicidad.