PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su contacto con la piel, ropa y ojos, y su inhalación al efectuar los tratamientos. Luego de la aplicación, lavarse cuidadosamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo que tuvieron contacto con

Suspensión Concentrada para el Tratamiento

No comer, beber ni fumar durante la preparación y/o aplicación. Usar antiparras, guantes, botas, ropa adecuada y todas las medidas precautorias necesarias.

RIESGOS AMBIENTALES: Peces: Moderadamente tóxico. Por el tipo de Composición: producto, no se espera exposición. Abejas: Ligeramente tóxico. Por el tipo de producto, no se espera exposición. Aves: Moderadamente tóxico. No dejar al alcance de aves domésticas o silvestres la semilla tratada.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Agregar agua ¼ de la capacidad del envase y verter el contenido en el tanque pulverizador. Repetir tres veces esta operación. El remanente del tanque mezclador, aplicar en lugares que no afecte la biodiversidad ambiental, como caminos de tierra y alambrados, alejados de viviendas y de zonas de transito frecuente de personas.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases deben ser totalmente vaciados, realizar la técnica de triple lavado e inutilizarlos perforando el fondo. Todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser reunidos para su destrucción, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente. No dañar la etiqueta para su identificación. Se debe recurrir a un servicio especializado de recolección de residuos de plaguicidas y/o Nº de Lote: envases vacíos de acuerdo a las siguientes indicaciones: verificar que estén totalmente vacíos y hayan sido sometidos al triple lavado.

ALMACENAMIENTO: Los envases deben ser conservados con sus tapas inviolables, en lugar fresco y fuera de los rayos solares directos y de los lugares en que Cont. Neto: puedan sufrir temperaturas inferiores a 0° C, apartados de semillas, insecticidas, fertilizantes, fungicidas, alimentos y utensilios para manejar éstos, a fin de evitar NO INFLAMABLE contaminaciones y/o inconvenientes al producto. Debe evitarse que contaminen el agua de riego y/o consumo.

DERRAMES: Cubrir el área con tierra o arena y carbonato de calcio. Barrer y recoger el producto en un contenedor bien identificado para ser luego transportado a una planta de tratamiento, para su destrucción.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto lavar abundantemente con agua todas las partes del cuerpo contaminadas. En caso de salpicaduras en ojos y piel lavar con abundante agua limpia, y LLAMAR ó CONCURRIR AL MÉDICO.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: CLASE II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. INHALATORIA: CATEGORIA II (NOCIVO). IRRITACION OCULAR: MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III: Causa irritación moderada a los ojos. Aplicar tratamiento sintomático. Antídoto: atropina.

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Por ingestión: gastroenteritis, somnolencia, problemas cardíacos y respiratorios. Por inhalación: irritación en vías respiratorias, dolor en faringe y ronquera. Por contacto: prurito, enrojecimiento de la

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

- Unidad toxicológica del Hospital General de Niños Dr. R. Gutiérrez: S. de Bustamante 1399 - Cap. Fed. Tel.: 4962-2247/6666.
- Centro Nac. de Intoxicaciones Policlínico Prof. Posadas: Av. Illía s/n Palomar, Bs. As. -Tel.: /4658-7777, o 4469-9300 internos 1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-
- Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina (UNBA) -Tel.: 5950-8804/06.
- Centro Toxicológico Permanente (todo el año, 24 hs. por día) T.A.S. -CASAFE. Tel.: (0341) 4460077/4242727. Tucumán 1544, Rosario -Sta Fe.

INSECTICIDA

Terápico para el Tratamiento de Semillas **GRUPO 1**

THIODICUR 30 FS **VERTISOLES**

de Semillas

thiodicarb: dimetil N,N'-tiobis[(metil imino)		
oxicarbonil] bis etanimidotioato30 g		
inertes, coadyuvantes y colorantes c.s.p 100 cm ³		

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscripto en SENASA con el Nº 36.257

Fecha de Vencimiento:

Origen: Uruguay

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN LA REPUBLICA ARGENTINA POR:



Av. Presidente Perón S/N, Parque Industrial Concordia Sector 3 Lote 1, (3200) Concordia, Prov. de Entre Ríos

NOTA: No estando la aplicación ni el almacenamiento bajo nuestro control, no nos responsabilizamos por daños eventuales que se puedan ocasionar a personas, animales o cultivos por su uso diferente al indicado en esta etiqueta.

GENERALIDADES: THIODICUR 30 FS VERTISOLES es un insecticida curasemillas específico para el control de larvas de lepidópteros que afectan diversos cultivos. No afecta a insectos benéficos tales como predadores y parásitos. Actúa inhibiendo la colinesterasa.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

PREPARACION: Suspender la dosis recomendada en 2 litros de agua cada 100 Kg de

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: el tratamiento debe realizarse en húmedo en un tambor rotativo, mezclando la dosis, más 2 litros de agua por cada 100 kg de semilla, directamente con la semilla hasta obtener una completa cobertura.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTI	VO PLAGA	DOSIS x	MOMENTO DE APLICACION
		100 KG. DE SEMILLA	
Algod		1,8 – 2,3	Tratar la semilla inmediatamente
	(Aphis gossypii)	litros	antes de la siembra.
	Trips del poroto (Caliothrips phaseoli)		
Giras	ol Bicho torito o Gusano	1,2 -1,8	Tratar la semilla inmediatamente
	blanco (Diloboderus	litros	antes de la siembra.
	abderus)		
	Mosca de la semilla		
	(Hylemyia spp.)		
Maíz	2.0 10	1,2 – 2,3	Tratar la semilla inmediatamente
	blanco (Diloboderus	litros	antes de la siembra.
	abderus)		
	Gusano saltarín o		
	Barrenador menor del maíz		
	(Elasmopalpus lignosellus)		
	Oruga militar tardía		
Cala	(Spodoptera frugiperda)	0.5.134	Totale le conille inne distance de
Soja		0,5 litros	Tratar la semilla inmediatamente
	Barrenador menor del maíz		antes de la siembra.
	(Elasmopalpus lignosellus)		
	Vaquita de San Antonio		
Trica	(<i>Diabrotica speciosa</i>) Bicho torito o Gusano blanco	350-470	Tratar la semilla inmediatamente
Trigo			
	(Diloboderus abderus)	cm3	antes de la siembra.

RESTRICCIONES DE USO: Algodón, Girasol, Maíz, Soja y Trigo: 20 días.

Las semillas tratadas serán destinadas únicamente a la siembra, no siendo aptas para alimentación, forraje o extracción de aceite.

"En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia."

La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley Nº 18.073 que prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con terápicos para tratamientos de semillas con granos destinados al consumo humano o animal.

COMPATIBILIDAD: THIODICUR 30 FS VERTISOLES es compatible con sales de metales pesados o con funguicidas como mancozeb, maneb, zineb, sulfato de cobre. Antes de realizar una mezcla, consultar con el Ingeniero Agrónomo

FITOTOXICIDAD: THIODICUR 30 FS VERTISOLES no genera fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.









